

Comuníquese con nosotros

Preguntas o molestias urgentes

Telehealth Nursing
651-229-3890

Otras preguntas acerca de su cuidado

Pacientes de St. Paul Clinic:
Línea directa Nurse Call
651-578-5000

Pacientes de otros sitios:
deben comunicarse con su
equipo de atención médica
de Gillette.

Citas
651-290-8707

Libros, DVD, etc.

Encuentre materiales acerca de
las discapacidades, las afecciones
médicas y de apoyo para los
encargados del cuidado.

Recursos de salud y educación

Campus de St. Paul, cerca de
skyway en el cuarto piso

651-229-3938

hre@gillettechildrens.com

Cómo prepararse para la sedación antes de su procedimiento

Preparing for Sedation Before Your Procedure | Spanish

Educación del paciente

PTT081-SP

Punto fundamental

- Es posible que el procedimiento al que usted se someterá requiera sedación. Eso significa que deberá tomar algunas precauciones específicas antes de su procedimiento.

Instrucciones para la Comida y la Bebida

El objetivo del monitoreo con EEG en video es visualizar las ondas cerebrales de los niños, no solo

9 Horas Antes de la Sedación

NO coma alimentos sólidos durante las 9 horas previas al horario programado para la sedación. Los alimentos sólidos incluyen los alimentos o los líquidos a través de los cuales usted no puede ver, como:

- Batidos de leche
- Bebidas mezcladas con yogur y jugo
- Jugo de naranja
- Huevos revueltos
- Pudín
- Sándwiches
- Cereales (incluidos los cereales para bebé)

Los medicamentos orales o líquidos administrados por sonda de gastrostomía están permitidos. (Consulte los detalles específicos en el título Cómo tomar medicamentos).

7 Horas Antes de la Sedación

NO beba leche o leche de fórmula durante las 7 horas previas al horario programado para la sedación.

NO reciba alimentación por sonda por 7 horas antes del horario programado para la sedación.

Los medicamentos orales o líquidos administrados por sonda de gastrostomía están permitidos. (Consulte los detalles específicos en el título Cómo tomar medicamentos).

5 Horas Antes de la Sedación

NO se debe beber leche materna durante las 5 horas previas al horario programado para la cirugía.

Los medicamentos orales o líquidos administrados por sonda de gastrostomía están permitidos. (Consulte los detalles específicos en el título Cómo tomar medicamentos).

3 Horas Antes de la Sedación

NO beba líquidos claros durante las 3 horas previas al horario programado para la sedación. Los líquidos claros (los líquidos a través de los cuales usted puede ver) son:

- Agua
- Jugo de manzana
- Jell-O o gelatina sin frutas
- Té
- Café negro
- Jugo de uva
- Paletas de hielo (Popsicles)
- Agua saborizada o Kool-Aid

NO tome medicamentos orales o líquidos administrados por sonda de gastrostomía durante las 3 horas previas al horario programado del procedimiento de sedación.

Continúa en la siguiente página.

Cómo Tomar Medicamentos

Los medicamentos deben estar en forma líquida o mezclados con líquido o alimentos espesados. Los medicamentos líquidos NO pueden ser de más de 30 mililitros, incluido el enjuague. Los medicamentos mezclados con alimentos o líquidos espesados NO pueden exceder los 30 mililitros.

Prueba de Embarazo

Todas las pacientes de 12 años o más que han comenzado a menstruar deben realizarse una prueba de embarazo antes de la sedación. La prueba debe realizarse en su clínica de atención primaria entre uno y siete días antes de su procedimiento. Lleve los resultados a su cita en Gillett e. Si eso no sucede antes de que usted venga a Gillett e, haremos la prueba aquí. (Tomaremos una muestra de orina o de sangre).

Qué Sucede si se Niega a Realizar la Prueba

La paciente, el cuidador/padre o el tutor legal tienen derecho a negarse a realizar la prueba. El médico y el equipo de sedación deberán determinar, entonces, si continuarán de todos modos con el procedimiento planeado. La negación será documentada en los registros médicos y se deberá obtener el consentimiento para continuar con el procedimiento.

Después de la Prueba

La paciente y el médico que lleva a cabo el procedimiento serán notificados de los resultados. **LOS RESULTADOS POSITIVOS DE LAS PRUEBAS SE MANTIENEN CONFIDENCIALES.** A menudo, es la paciente quien decide cómo comunicará los resultados a sus padres/cuidadores. Sin embargo, si una paciente no puede tomar decisiones independientes o no puede hablar, los trabajadores sociales y el médico decidirán si es apropiado informar a los cuidadores los resultados de la prueba.